



سین بیوفیت پی

پودر مخلوط در خوراک

پروبیوتیک + پری بیوتیک + عصاره گیاهی

بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش

جهت استفاده در انواع طیور

ترکیبات:

پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (*Lactobacillus acidophilus*)

پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (*Lactobacillus casei*)

پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (*Bifidobacterium bifidum*)

پروبیوتیک انتروکوکوس فاسیوم (*Enterococcus faecium*)

(مجموع پروبیوتیک ها حداقل 1×10^{11} در هر کیلوگرم)

پری بیوتیک دکستران الیگو ساکارید

عصاره گیاه شیرین بیان

سین بیوفیت پی محصول ماکیان دام پارس یک افزودنی خوراک متشکل از پروبیوتیک ها، پری بیوتیک و عصاره گیاه شیرین بیان است که به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و در نتیجه بهبود عملکرد گله به ویژه در شرایط استرس کمک می کند. دستگاه گوارش یکی از مهمترین اندام های بدن است. بر هم خوردن تعادل باکتری های فلور روده علاوه بر مشکلات گوارشی، سیستم ایمنی را مختل کرده و سلامت حیوان را به خطر می اندازد. پروبیوتیک ها نوع مفیدی از باکتری ها هستند که نقش آن ها حمایت از سلامت روده و حفظ تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش است. پری بیوتیک ها مواد مغذی لازم جهت تامین انرژی باکتری های مفید را فراهم می کنند و باعث رشد پروبیوتیک ها به صورت اختصاصی و تقویت اثر آن ها می شوند. به مکمل حاوی پروبیوتیک و پری بیوتیک سین بیوتیک می گویند. در این میان همراه کردن این ترکیبات با عصاره گیاهی، اثر آنها را تقویت کرده و در نهایت منجر به سلامت طیور، کاهش ضریب تبدیل و افزایش تولید و راندمان گله می شوند.

مکانیسم اثر سین بیوفیت پی:

باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، جزئی از فلور طبیعی دستگاه گوارش طیور محسوب می شوند. این میکروارگانیسم ها پس از جایگزینی در دستگاه گوارش، با تولید اسید لاکتیک به میزان زیادی از رشد عوامل پاتوژن ممانعت کرده و خطر ابتلا به بیماری های گوارشی را کاهش می دهند. کاهش pH دستگاه گوارش و افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی که در نتیجه فعالیت این باکتری ها حاصل می شود، سبب جذب بهتر ریزمغذی ها از جمله ویتامین ها، اسیدهای آمینه و عناصر معدنی مانند روی، فسفر، کلسیم و منگنز شده و در نتیجه موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردد. همچنین این باکتری ها با تحریک سیستم ایمنی سبب افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها شده و نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ها را به شدت کاهش می دهند. استفاده همزمان این باکتری ها به همراه دکستران موجب افزایش تکثیر و بهبود عملکرد آن ها در محیط روده می شود. عصاره گیاه شیرین بیان حاوی ترکیبات متنوعی از جمله ساپونین های تری ترپنوئید، فلاونوئیدها، ایزوفلاون ها، کومارین ها و پلی ساکاریدها می باشد. تری ترپنوئیدها و دیگر ترکیبات موجود در عصاره شیرین بیان از جمله فلاونوئیدها دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و سبب کاهش استرس های اکسیداتیو حاصل از عوامل فیزیکی (گرما، رطوبت، حمل و نقل و...) و شیمیایی (آفلاتوکسین های موجود در جیره غذایی و ...) شده و در نتیجه باعث بهبود شاخص های بیوشیمیایی خون و عملکرد ارگان ها می شوند. شیرین بیان همچنین از طریق افزایش ترشح موکوس و فعالیت ضد پپسین خود سبب پیشگیری و بهبود زخم های گوارشی می گردد.


فواید و اثرات سین بیوفیت پی:

- افزایش هضم و جذب مواد غذایی و بهبود عملکرد دستگاه گوارش
- کاهش پاتوژن ها و تقویت فلور میکروبی دستگاه گوارش
- کاهش التهابات و زخم های گوارشی
- پیشگیری از عفونت های گوارشی (سالمونلا، ای کلای و ...)
- پیشگیری از اسهال و مشکلات گوارشی
- تقویت سیستم ایمنی و پاسخ به واکسیناسیون
- بهبود ضریب تبدیل خوراک
- افزایش وزن گیری و وزن پایان دوره
- بهبود عملکرد گله خصوصا در شرایط استرس (فیزیکی و شیمیایی)
- افزایش تولید و بهبود کیفیت تخم مرغ (بهبود کیفیت پوسته و کاهش لمبه اندازی)
- جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد
- کاهش تلفات




بررسی اثر سین بیوفیت پی بر وزن، ضریب تبدیل غذایی، مصرف دان، تولید و درصد تلفات


میانگین ضریب تبدیل غذایی
در تیمارهای مختلف




میانگین درصد تلفات کل دوره
در تیمارهای مختلف




میانگین وزن 42 روزگی (گرم)
در تیمارهای مختلف




میانگین شاخص تولید
در تیمارهای مختلف



میانگین کل دان مصرفی (گرم)
در تیمارهای مختلف



میانگین وزن زنده و وزن لاشه
در تیمارهای مختلف



■ سین بیوفیت پی ■ شاهد

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف	طیور هدف
200 گرم در هر تن خوراک	طیور گوشتی تا 21 روزگی
100 گرم در هر تن خوراک	طیور گوشتی از 21 روزگی تا پایان دوره پرورش
300 گرم در هر تن خوراک	پولت تخم گذار و مادر تا 21 روزگی
200 گرم در هر تن خوراک	پولت تخم گذار و مادر از 21 روزگی تا پایان دوره پرورش
100 گرم در هر تن خوراک	مرغ تخمگذار و مادر در دوره تولید
200 گرم در هر تن خوراک	بوقلمون، شتر مرغ و بلدرچین تا 21 روزگی
100 گرم در هر تن خوراک	بوقلمون، شتر مرغ و بلدرچین از 21 روزگی تا پایان دوره پرورش

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، به دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
پس از هر بار مصرف درب پاکت را ببندید.

تداخل دارویی:

هیچ گونه تداخل دارویی نداشته و با انواع ترکیبات جیره، آنتی بیوتیک ها، افزودنی ها و واکسن ها سازگار می باشد.

بسته بندی:

پاکت های 1 کیلوگرمی

تاریخ انقضا:

دو سال پس از تاریخ تولید



Our Website



Tehran, Iran



+982166597230-31



manager@makiandampars.com



www.makiandampars.com



@mmdpp



@makiandampars



@makiandampars