



لاوارن

داروی صد در صد گیاهی بهبود دهنده عملکرد کلیه مناسب برای انواع طیور محلول خوراکی

ترکیبات:

عصاره گیاه گزنه

مکانیسم اثر:

لاوارن حاوی عصاره طبیعی گیاهان نظیر گیاه گزنه بوده و به نحوی فرموله شده که اجزا مختلف آن اثرات درمانی یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند. مهمترین مواد موثره در این دارو شامل ترکیبات فنولی، کوئرستین، کافئوئیل مالیک اسید و کلروژنیک اسید میباشد. مواد موثره موجود در **لاوارن** با افزایش حجم و جریان ادرار، از احتباس ادرار در مجاری ادراری جلوگیری کرده و منجر به دفع رسوبات از کلیه و جلوگیری از تشکیل سنگ های کلیه و مثانه می گردند. گزنه موجود در این محصول در کاهش التهاب و عفونت دستگاه ادراری بسیار موثر است. همچنین گزنه به دلیل محتوی بالای آهن و ویتامین C عملکرد آنتی اکسیدانی قوی و ضد استرس دارد. به طور کلی محصول **لاوارن** با تاثیر مثبت بر کلیه ها و کاهش بار کلیوی، موجب بهبود عملکرد کلیه و افزایش اشتها و آب مصرفی می گردد.

موارد مصرف:

- ادرار آور
- بهبود نفريت حاد و مزمن و پيشگيري از نارسايي كليۀ
- دتوكس داروها و مواد شيميائي (بعد از آنتي بيوتيك تراپي)
- ضد عفوني كننده مجاري ادراري
- در موارد بالانس نامناسب املاح جيره (كلسيم، فسفر، سدیم و غيره)
- در مواقع ابتلا به بيماري هاي ويروسي (مانند برونشيت، گامبورو، آنگارا و ...) و باكتريائي كه موجب التهاب و نكروز كليۀ ها می شوند
- در مواقع بروز سندرم آسيت
- پيشگيري و بهبود نقرس پرندگان و دفع رسوبات اورات
- در زمان نياز به درمان هاي حمايتي با هدف كاهش بار كليوي
- به دنبال استرس ها مانند نوک چيني، واكسيناسيون و استرس گرمائي
- در هنگام بروز مشكلات حركتي ناشي از اختلالات متابوليسمي

Anti-bacterial

Inhibit Gr - & Gr + Bacteria

Anti-viral

Lectins
Prevent Virus Entrance
Prevent Virus Replications

Anti-inflammatory


Inhibit COX & lipoygenase
Inhibit Pro-inflammatory Cytokines
Inhibit NF-KB
Reduce NO
Inhibit Inflammatory Prostaglandins
Improve Nephritis

Antioxidant




Polyphenols
Vitamin C
Scavenge Free Radicals
Inhibit ROS Formation
Increased Antioxidant Enzymes Activity
Prevent Oxidative Stresses

Diuretic

Scopoletine, β -sitosterol,
caffeoyl malic acid
High Potassium & Sodium Ratio
Antiuro lithiatic
Ascites Treatment



اثرات لاوارن بر بهبود عملکرد کلیوی طیور



مقدار و روش مصرف:

جهت پیشگیری و استفاده بعد از درمان های آنتی بیوتیکی: ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی ۱ تا ۲ روز در هفته در موارد درگیری با عفونت های ویروسی (برونشیت، گامبورو، آنکارا)، عفونت های باکتریایی و نفريت حاد: ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز (در موارد آسیب های حاد کلیوی دز به ۵۰۰ میلی لیتر قابل افزایش است) در موارد آسیت و نقرس: ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز و پس از آن ۱ تا ۲ روز در هفته پس از مصرف آنتی بیوتیک ها با هدف کاهش بار کلیوی: ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی ۲ روز در هفته در موارد استرس گرمایی: به مدت ۳ روز در آب آشامیدنی و پس از آن با توجه به شرایط گله می توان مصرف را ادامه داد.

تداخل دارویی:

هیچ گونه تداخل دارویی نداشته و با انواع ترکیبات جیره، آنتی بیوتیک ها، پروبیوتیک ها و واکسن ها سازگار است.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت ورود تصادفی دارو به چشم ، سریعاً با آب فراوان شسته شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، به دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود

بسته بندی:

بطری های ۲۵۰ میلی لیتری

تاریخ انقضا:

۳ سال پس از تاریخ تولید



Our Website



Tehran, Iran



+982166597230-31



manager@makiandampars.com



www.makiandampars.com



@mmdpp



@makiandampars



@makiandampars